

## 献血基準と献血の間隔

項目 献血の種類	全血献血		成分献血			
	200mL	400mL	血漿	血小板		
1回献血量	200mL	400mL	600mL 以下 (循環血液量の 12%以内)			
年齢 (※)	16 歳～69 歳	男性: 17 歳～69 歳 女性: 18 歳～69 歳	18 歳～69 歳	男性: 18 歳～69 歳 女性: 18 歳～54 歳		
体重	男性: 45kg 以上 女性: 40kg 以上	男女とも 50kg 以上	男性: 45kg 以上 女性: 40kg 以上			
血圧	最高血圧: 90mmHg 以上 180mmHg 未満 最低血圧: 50mmHg 以上 110mmHg 未満					
脈拍	安静に保った状態での脈拍が 40 回/分以上 100 回/分以下					
体温	37.5°C 以上の発熱をしていないこと					
血色素量 (ヘモグロビン 濃度)	男性: 125g/dL 以上 女性: 120g/dL 以上	男性: 13.0dL 以上 女性: 125g/dL 以上	12.0g/dL 以上 (赤血球指数が 標準域にある女性は 11.5g/dL 以上)	12.0g/dL 以上		
血小板数	—		—	15 万/ $\mu$ L 以上 60 万/ $\mu$ L 以下		
年間総献血量	200mL 献血と 400mL 献血を合わせて 男性: 1,200mL 以内 女性: 800mL 以内					
年間献血回数	男性: 6 回以内 女性: 4 回以内	男性: 3 回以内 女性: 2 回以内	血小板成分献血 1 回を 2 回分に換算して 血漿成分献血と合計で 24 回以内			
採血 間隔	前回					
	200mL	男女とも 4 週間後の同じ曜日から				
	400mL	男性: 12 週間後 女性: 16 週間後 の同じ曜日から	男女とも 8 週間後の同じ曜日から			
	血漿	男女とも 2 週間後の同じ曜日から				
	血小板	なお、血漿を含まない場合には、1 週間後に血小板成分献血が可能。 ただし、4 週間に 4 回実施した場合には、次回まで 4 週間以上期間をあけること。				
共通事項	次の方からは採血ができません。 ① 妊娠していると認められる方、又は過去 6 カ月以内に妊娠していたと認められる方 ② 採血により悪化するおそれのある循環系疾患、血液疾患その他の疾患に罹っていると認められる方 ③ 有熱者その他健康状態が不良であると認められる方					

※ 65～69 歳の方は、60～64 歳までの間に献血の経験がある方に限られます。