


けいれん、意識混濁時のフローチャート

(初めての発作や、医師の指示がない場合)



けいれん、意識混濁時のフローチャート・医師指示書

() 年 () 組 ()



- ・全身をがくがくさせる
- ・全身をつっぱらせる
- 上記のいずれかで、かつ
- ・声をかけても返事しない



- ・ぼーっとして意識が薄らいでいる

- ・体を横たわせる
(嘔吐しそうな場合は横に向ける)
- ・口にもものは詰めない

- ・倒れないように支える
- ・座ることができたら座らせる



- ・周囲の危険なものを取り除く
- ・人を呼ぶ
- ・観察と記録 (動画が望ましい)



- 5分
- () 分
- 以内に済んだ

- ・ 5分
- () 分
- たってもおさまらない
- ・ 10分
- () 分
- 以内に反復

- 動かなくなり呼吸が止まった

- 意識がはっきりした

- 意識がはっきりしない

- 医師の指示に基づく処置薬等
- ()
- 薬は使わず以下に進む
- (別に指示書あり)

- 一次救命処置 (BLS) に進む

- 保健室で経過観察
- 保護者に連絡する

- 救急車を呼ぶ
- ()

医療機関 () 主治医 ()
 保護者 () フローチャートに同意します
 提出日 () 年 () 月 () 日

日本小児神経学会 保育・療育・教育機関におけるけいれん・てんかんの発作・生活管理 WG 作成 Ver.1