

38.0℃以上の発熱



7119番で症状の相談 P.29

発熱

3か月
未満

3か月～6歳

- ☐ 元気がなく、ぐったりしている。
- ☐ オシッコが出ない。
- ☐ いつもと違って活気がない。
- ☐ よく眠れず、ウトウトしている。
- ☐ 水分をとるのをいやがる。

1つも
「はい」が
ない

「はい」が
1つ以上
ある

お子様の様子を見つ、
診療時間になってから
かかりつけの先生に
診てもらってください。



(連休や年末年始のときは、
翌日に休日急患診療所や
救急医療機関を受診してください。)

ただし

症状が大きく変わった場合は
休日急患診療所や救急医療機関を
受診してください。



家庭での対処方法

- ① 熱の出始めはあたたかめに、熱が出たら涼しくしてあげましょう。
- ② 暑そうなら涼しく、寒そうならあたたかくしましょう。
- ③ 水分（乳幼児用イオン水など）をこまめに与えましょう。
- ④ 汗をかいていたら、汗をふいて着替えをさせましょう。
- ⑤ 頭やわきの下をいやがらない程度に冷やしましょう。
- ⑥ 元気そうなら、解熱剤を使うのは控えましょう。

- 休日急患診療所
- 救急医療機関

