

げり



7119番で症状の相談 P.29

げり

3か月未満

- ☐ 元気がなく、ぐったりしている。
- ☐ 3時間以上、オシッコがでない。
- ☐ おう吐がある。
- ☐ 38.0℃以上の熱がある。
- ☐ くちびるや口の中が乾燥している。
- ☐ 血液の混じったウンチがでる。
- ☐ 不機嫌が持続する。

3か月～6歳

- ☐ 元気がなく、ぐったりしている。
- ☐ オシッコがでない、色の濃いオシッコをする。
- ☐ ひどくお腹を痛がる。
- ☐ よく眠れずに、ウトウトしている。
- ☐ 水分をとるのをいやがる。
- ☐ 目がくぼんでいる。
- ☐ くちびるや口の中が乾燥している。
- ☐ 血液の混じったウンチがでる。
- ☐ 不機嫌が持続する。

1つも
「はい」が
ない

お子様の様子を見つ、
診療時間になってから
かかりつけの先生に
診てもらってください。



(連休や年末年始のときは、
翌日に休日急患診療所や
救急医療機関を受診してください。)

ただし

症状が大きく変わった場合は
休日急患診療所や救急医療機関を
受診してください。



「はい」が
1つ以上
ある

- 休日急患診療所
- 救急医療機関



家庭での対処方法

- ① げりがひどいときは、食べ物よりはまず水分を十分に与えましょう。
- ② 家庭内の感染を防ぐために、排泄物の始末をした後に手をよく洗いましょう。