

けいれん・ふるえ



- けいれんが止まても意識がはっきりしない。
(目が合わない。お父さん、お母さんが分からぬ。)
- くちびるの色が紫色で、呼吸が弱い。
- けいれんが5分以上続く。
- 何度もくり返しけいれんが起きる。

1つでも該当

119番
救急車を呼ぶ!

該当しない

- はじめてのけいれん。
- 生後6か月未満。
- 6歳以上。
- けいれん時、体温が38.0°C以下であった。

- けいれんに左右差がある。
- おう吐、おもらしをともなう。
- 最近(1か月以内)頭をぶつけたことがある。

1つも「はい」がない

「はい」が1つ以上ある

※すでに診断がついており、今までに何度か

起こったことがあるけいれん発作(てんかん)。

※けいれんかどうかわからない。

※左右対称のけいれんが数分でおさまり、けいれんのあと短時間で意識を回復し、その後いつもと変わらない。

※印に該当する場合は、かかりつけの先生の指示に従ってください。

○休日急患診療所 ○救急医療機関



7119番で症状の相談 P.29

お子様の様子を見つめ、
診療時間になってから
かかりつけの先生に
診てもらってください。



（連休や年末年始のときは、
翌日に休日急患診療所や
救急医療機関を受診してください。）

ただし

症状が大きく変わった場合は
休日急患診療所や救急医療機関を
受診してください。



家庭での対処方法

- ① 顔を横向きにして、衣類をゆるめましょう。
- ② 体を揺すったり、たたいたりしないようにしましょう。
- ③ 口の中に指や物をいれてはいけません。