げり



＃7119番で症状の相談 p.29

3か月未満

- ☐ 元気がなく、ぐったりしている。
- ☐ 3時間以上、オシッコがでない。
- ☐ おう吐がある。
- ☐ 38.0℃以上の熱がある。
- ☐ くちびるや口の中が乾燥している。
- ☐ 血液の混じったウンチがでる。
- ☐ 不機嫌が持続する。

3か月～6歳

- ☐ 元気がなく、ぐったりしている。
- ☐ オシッコがでない、色の濃いオシッコをする。
- ☐ ひどくお腹を痛がる。
- ☐ よく眠れずに、ウトウトしている。
- ☐ 水分をとるのをいやがる。
- ☐ 目がくぼんでいる。
- ☐ くちびるや口の中が乾燥している。
- ☐ 血液の混じったウンチがでる。
- ☐ 不機嫌が持続する。

「はい」が1つも**ない**

お子様の様子を見つつ、
診療時間になってから
かかりつけの先生に
診てもらってください。



（連休や年末年始のときは、
翌日に休日夜間急患センターや
救急医療機関を受診してください。）

ただし


症状が大きく変わった場合は
休日夜間急患センターや
救急医療機関を受診してください。



※受診するか迷ったら＃7119にご相談ください。

「はい」が1つ以上**ある**

○休日夜間急患センター
○救急医療機関



家庭での対処方法

① げりがひどいときは、食べ物よりはまず水分を十分に与えましょう。

② 家庭内の感染を防ぐために、排泄物の始末をした後に手をよく洗いましょう。